

秘傳眼科全書

秘傳眼科全書卷之三

內障歌訣上篇

不疼一少癢漸分明
或見蠅飛如亂出
此般狀樣因何得
大叫大啼驚與怒
初時一眼先昏瞶
萬般苦楚空憔悴
此時服藥難期定
日久既因全黑瞶

障霧輕明漸一濃
或出懸蠅在虛空
肝臟停留熱結風
腦脂流下黑睛中
久後相牽與一同
只緣肝氣不相通
縱有良方也沒功
時名內障雙瞳

內障二十有四般

醫師命者要推窮

妙藥救時須盡家

金銀一撥日還空

虛心將息須防慎

莫道他時病復從

鍼者但行賢哲行

惻隱之心是善緣

有血莫驚須下手

裏鍼依舊再開看

忽然撞起膜重上

服藥三旬始見功

七月解封須見物

花生水動莫多言

還睛九子堅心腹

百日冰明復舊根

歌訣中篇

內障二十有四般

後學之人仔細看

白膜一點如星子
若得鍼法動圓緊
冷熱須明虛與實
不然怕下金鍼法
開鍼遠近須依訣
病虛胎產并脹孕
不雨不風無吉日
安心定氣堅心守
患者避風將息睡
針者但能賢哲行

下鍼方可得安痊
誤損方知療作難
調和四體得身安
嘔吐勞神醫又翻
鍼形不可一般
下手應知療得難
齋齋七日在針端
念善親姻莫雜喧
休留憂慮要心寬
惻隱之心是善緣

有血莫驚須下手
忽然撞起膜重上
七日解封須見物
還睛九子堅心腹

歌訣下篇

內障金針下了時
嚴冬緊裹須包縛
頭眠軟枕須安穩
封後忽然微有動
或針或撥依經訣

裏針依舊再開看
服藥三旬見朗然
花生水動莫多言
百日光明復舊元

醫師言語要緩知
夏月應嫌有扇揮
斜卧三朝莫厭遲
薰風牽動莫他疑
痛極任將艾熨之

口吐酸水，湯辣熱，起則恐因傷勞力，七朝薄粥溫服，大小便時須緩，高聲叫喚，兼因氣，然心莫意陰陽事，一月不須沐浴，臉五七略知睛翳去，眼疾證候總歌。

赤眼赤腫，積毒。

胃安神定，始相宜，頭翻倒卧，莫從伊，振著身，闕事不宜，母令自去，要扶持，驚動睛輪，見雲飛，夫婦恩情，暫新離，針痕偏著，痛微，服藥並除病，去基。

赤而宜痛肝之實。

赤而昏者肝之虛

大眦赤者肝之實

小眦赤者心之虛

白眦多者肺之實

多眦淚出肺之虛

羞明怕日脾之實

赤脉蕩眼肝之實

視物不明脾臟虛

茫々黑花腎之實

迎風有淚腎之虛

白膜遮睛肝之實

迎風受痒肝邪傳

早晨昏者頭風痒

日夜昏者疾之作

夜間昏者定腦冷

浮翳遮睛肺之熱

夜間痛者陰之毒

日間痛者陽之毒

包蟬突起眼之損

瞳仁倒入血氣衰

目，睫倒入，五臟損
頭，暈目，前赤，星亂，
赤，而有痛血之實，
入，腎物，遮衛經，實
左，赤，傳右陽經，旺
左右相傳，熱邪攻，
每，年發者，是天行
積，年赤者，肝受風，
眼珠突，出，臟不和，
目，毛倒，睫，臟腑虛

赤膜遮睛，五臟炎，
不痒，不痛，血氣衰，
血侵睛，有肝虛熱，
痛，而增寒，衛中虛，
右，赤，傳左陰經，旺
目近視者，臟腑勞，
拳，毛倒，睫，肺之損，
兩目赤者，風毒攻，
眼見赤花，肝之虛，
眼中虛血厥陰旺

大便後身臟不和

陽毒病後下元虛

陰毒病後熱氣攻

過水眼昏腎受偏

孕婦目昏肝不足

產後昏血氣衰

小兒赤爛胎風熱

小兒癰疽胎受毒

小兒白障肺壅熱

小兒生翳感風熱

小兒雀目肝不和

小兒青盲腎經虛

小兒生瘡胎穢濁

小兒疳眼五臟虛

青盲有翳肝風熱

睛目之疾肝邪尅

眼內出膿陰氣攻

目偏視者臟腑勞

目眇者血氣凝滯

兩目昏瞶熱衝腦

或針或割目之損

用藥醫師細推詳

醫師論眼科內外七十二証

內障二十四

圓翳浮沉翳

水屑散橫開

偃月大小雲

棗花驚振眼

青烏綠黑風

肝虛目痛病

雷頭風金星

高風雀目證

肝虛雜盲異

白翳黃心眼

黑花續胎風

外障四十八

大眦赤脉侵

努肉攀睛障

雞冠蜎肉形

兩臉粘眼者

胞肉膠凝眵

胞肉生瘡少

臉生風粟多 天行赤眼毒 大患後生翳

暴赤眼生翳 暴風客熱治 疼如神祟怪

痛如針刺因 傷寒熱病後 風牽出臉間

風牽喎斜者 被物撞破之 撞刺生翳膜

毒血催瞳仁 黑翳如珠樣 翳睛疼痛難

旋螺睛突起 突起睛高同 臉硬睛疼疾

白魚鱗形 水蝦蟆窠狀 玉翳浮滿珠


膜入水輪上 釘翳根倏難 赤膜下垂長

黃膜上衝遮 逆順生翳障 漏睛膿血流

飛塵入眼內 拳毛倒睫生 衝風淚出異

肝風積熱勞	起坐生花虛	混睛白赤痒
瞳仁干欬病	痒極難任風	鵝眼凝睛硬
輓轡轉關蔽	小兒通睛驚	小兒疹痘衝
臉中生贅翳	小兒疳眼虛	胎風赤爛眼
久年爛弦風	小兒青盲疾	醫家子細推

障 內 翳 圓



編次內外障共七十餘症其啓病之源治病之法對

症湯散丸藥詳載編中

此圓翳恰如西瓜團下浮在水面上占
過金井頗大些初起如薄霧輕烟不痒
不疼漸レ昏昧故曰內障先患一眼後
則兩眼俱昏此乃勞心焦思之殷灯窓
房飲之過以致肝腎二經受傷腦脂流
下肝風衝上得成是疾宜用天字金針
從翳投其針尾與翳平從翳上蓋下依
訣用針緩レ取下其鵝翎針（其法詳）

方離瞳仁停針良久方可出針眼目立見光明多氣旺之人其翳復浮起須令他睡久依訣進前針不可現出外若現出外恐傷黃仁傷却黃仁則傷血輪宜服補肝散補腎丸

補肝散

羚羊角二錢 白茯苓

細辛

人參

羌活

玄參

車前子

黃芩

楮實子

石斛各五錢

防風一兩

右研細末每服二錢米飲調下

補腎丸

五味子炒

熟地黃酒蒸

枸杞子酒洗

楮實子酒洗

覆盆子酒浸

石斛各五錢

肉苁蓉酒洗

虎骨酒洗


磁石酒洗

車前子各五錢

沉香別研

青鹽各五錢

障內翳盛



右研細末煉蜜為丸如梧子大每服七十九空
心鹽湯送下

此翳淡白頻如脂膏之色不圓如薄霧
浮金井近黃仁邊罩住不見三光陰看
緩而大陽看緩而小瞳仁欲散此
多有四圍近黃仁粘緊年壯氣旺難撥
得下若係老人氣衰者無不効矣依訣
進針其針頗向外方取得膜著從上諒
盡下來其針之尾轉運切不可境向外
恐傷黃仁血動薩慨瞳仁昏朦不能視

物須服足血退風之劑漸可也宜人參蒙花酒煎散還精丸

人參散

人參

白茯苓

石決明煅 州決明

白茯苓

麥門冬

蟬蛻

光絲子

黃芩

地骨皮

牛膝

木賊

遠志

青柏子

枳殼

甘州

木通

等分為末以木賊州決明葉煎湯調食後溫服

密蒙花散

密蒙花

石決明

羌活

菊花

白茯苓

木賊州

枸杞子

青柏子

蔓荊子

等分為末每服三錢食後茶調下

酒煎散

當歸

赤芍

防風

防己

荆芥

牛蒡子

耳艸

等分爲末每服三四錢水一盞酒一盞煎至七

分食後溫服

還精丸

鬼絲子

酒煮

川芎

木賊

蒺藜

炒

白芍

熟地黃

耳艸

羌活

青柏子

密蒙花

當歸


枸杞子

肉蓯蓉

右研細末煉蜜爲丸如梧子大每服三十丸食

後白湯通下

障 內 翳 浮



浮翳者此乃浮在外近黃仁金井邊蓋
 因三焦不順肝風上衝肺熱氣盛腦脂
 流下不痒不痛臨光無神翳如銀色睛
 瞳赤色陰看略大陽看略小治法用天
 字金針從翳膜撥上蓋下針法其勢須
 近外方得膜著緩用針收下翳切忌
 針尾割著黃仁但此翳年老之人氣衰
 膜柔而軟易于服收若年壯之人氣旺
 膜堅而健難以收服撥下仍浮須經三
 五年下針方可取效宜服撥雲散洗肝

散墜翳丸

撥雲散

黃連

黃芩

石決明

川芎

白芍

州決明

麥門冬

菊花

甘州

白水煎食後服

洗肝散

當歸

羌活

梔仁

薄荷

防風

大黃

甘州

加膽州生地川芎

右白水煎食後服

墜翳丸

石決明

牛膽

青魚膽


羊膽各五錢

麝香

分四

右陰乾為末為丸梧子大每服十丸空心茶送下

沉翳內障



此沉翳者其翳沉在裏也四圍與黃仁離遠不相粘帶翳膜中之好翳也蓋因肝臟勞熱眼前常見黑花年久凝結成翳其色青白瞳仁若沉在水中治法宜用地字金針一進其翳如綿之軟撥開裏針一收就下停針片刻便可出針眼目十分光明雖二三十年者立見効耳此翳多半睛候黃色者是也不分老幼之人皆可治之宜服清肝散密蒙花散省風湯鎮肝丸

清肝散

當歸

赤芍

白芍

羌活

柴胡

前胡

知母

防風

荊芥

薄荷

黃芩

川芎

桔梗

牛蒡

石膏

滑石

加枳殼黃連

右白水煎食後熱服

齊蒙花散

方載前溫醫內障條

省風湯

犀角

玄參

知母

防風

大黃

各五錢

黃芩

桔梗

各二兩


羚羊角

二錢五分

右研為末每服二錢水一盞用灯心竹葉同煎

食後服

水 翳 內 障



鎮肝丸

人參

白茯苓

五味子

石決明

細辛

山藥

藥本

車前子

羌活

楮實子

夏枯草

石解州

右研細末煉蜜為丸如梧子大每服四十丸清茶送下

此水翳者如冰雪之狀向其翳中須有裂痕陰看略大陽看略小無嘔吐無頭痛此翳由肝臟積熱久成內障其翳如冰腫仁術大治法用他字金針從翳上依法運針蓋諒此翳多片下下來不

成團圓一蓋一情如此之狀不用收針運法停久七
日解封之後宜服退翳丸而目光明如舊若有頭疼
鼻頰骨疼或因嘔吐起因其翳亦如冰雪之狀陰看
不大陽看不小如此之狀翳不可撥縱撥不能得下
宜服通肝散涼肝散退翳丸

通肝散

白芍

柴胡

黃芩

細辛

州決明

龍膽州

蔓荊子

青柏子

木賊

蒺藜

防風

玄參

右白水煎食後服

涼肝散

當歸

赤芍

龍膽州

羌活

細辛

玄參

艸決明

防風

荊芥

薄荷

川芎

青相子

蒺藜

木賊

白_手水煎食後溫服_ス

退熱丸

青相子

蒺藜

木賊

谷精艸

艸決明

蟬蛻

密蒙花

牛蒡子

龍膽艸

防風

歸須

赤芍_{各一兩}

夏枯艸

陳皮_{各七錢}

夜明砂

_{錢五}

犀角_{錢一}

石決明

_{錢一}

右研細末

_{煉蜜為丸}


如梧子大

每服三十丸

不


拘時候酒送下

障 內 翳 滑



此障翳者其翳如水晶珠子光瑩不大
不小陰看雲膜則大陽看雲膜則小初
患不痒不痛先病一目後乃相牽漸
失明蓋因腦脂流下肝風上衝則致是
疾治法宜用地字金針從翳上緩々蓋
下此翳最滑其針須按翳上中間若偏
外其翳滾外起若如此滾須令患者睡
良久與之茶湯或能飲酒者與之三四
盞無妨以壯其膽然後再進針收之即
下者停針須良久隨依方服藥再下浮

障·內翳·翳



起多有次，月再停者，開封亦再可收下，三月不宜針。

宜服密蒙花散還精丸。

密蒙花散

還精丸

方共載前，臨翳內障條。

此散翳者，翳膜類，偏疥瘡，形狀有重皮包着，內有漿水，似膜或如清鼻涕，初起因肝經積熱，風毒上攻，久而生翳，漸至失明，治法宜用天字金針，依訣而進，從上撥下，緩然其膜，將離瞳仁，針勢若緊，其翳頗有白漿水流下，一半流出金

并外水輪內流眼通向如此之狀以膏封令仰睡五
七日將養其漿水還復流入金井內其眼漸見光與
宜服四物湯洗肝散還精丸墜翳丸

四物湯

當歸

川芎

芍藥

熟地黃

加玄參谷精草克蔚子生地黃桑白皮

右清水煎食後服

洗肝散

當歸

羌活

薄荷

槐仁

大黃

防風

甘草

川芎

加膽草生地黃

右研為末每服二錢白湯調服或煎服


還精丸

方載前，儘翳內障條

墜翳丸

方載浮翳內障條下

橫開翳內障



橫開翳者何也。因肝腎二經受風熱毒攻，以致瞳仁漸生翳膜，青色只一重似紙，厚托在黃仁金井內。金井外無團逼之狀，最難動針。向內則取不着，針向外恐傷黃仁。須天字金針從上，諒下平，針勢似以水上蓋浮萍之狀，亦用物硲面橫收一重油紙之類是也。此翳開鋒多，開近此方得法也。宜戒胡復

明陽省風湯治眼丸還精丸去翳膜丸

柴胡復明湯 柴胡 黃芩 羌活 獨活

肉芍 桔梗 川芎 白芷 白朮

蒼朮米泔水浸 五味子 蔓荊子 其艸 藁本

各等分清水煎食後服

省風湯 方載前沉翳內障條


治睛散 當歸 白朮 白芍 羌活

赤芍 菊花 密蒙花 梔子

白朮煎起碗加蜜少許和服

還睛丸 方載前翳內障條

障內翳月偃



去翳膜丸

鬼子尿焙乾為末煉蜜為丸如梧子大

每服二三十丸米飲下

偃月翳者此症為肝腎俱勞致生翳障如偃月白色不能辨物恰似初九初十夜月半現半埋其翳上一半向裏生下一半向外生帶黃仁如此之症仰看高可見些物若低頭看全不見陰看大陽看小治法宜用地字金針一撥就下停針良久出針其翳又浮上何也上半邊不粘黃仁下半邊粘黃仁不脫須有顯

倒針法從下接上將下也撻離黃仁方運針法依口訣方可成功宜服補肝散修肝散補腎丸

補肝散 方載前圓翳內障條

修肝散

當歸

耳艸

防風

連翹

薄荷

梔子

黃芩

大黃

艸決明

蔓荊子

細辛

肉芍


右研細末每服三錢食後加蜜少許調下日進

三服

補腎丸

方載前圓翳內障條

大雲翳障



大雲翳者不痒不痛漸以昏朦乃七情所傷肝腎二經鬱結不散致成是疾其翳似小龍眼核大陰看滿眼全然是大陽看略小此翳最健有力宜用天字金針開其頭針法從上撥下須離瞳仁停十分久方可取針出不可急而不久恐又低起若浮上須令他睡倒良久或睡一時之久又可進針緩收下此翳年老者人無妨可撥若後生年壯氣旺其翳帶白終難下手須齋三五箇月然後

可動針宜服冲和養胃湯補肝散還精丸

冲和養胃湯 當歸 白朮 柴胡 五味子

白芍 黃芪 羌活 甘州炙 防風

人參 白朮 升麻 乾葛 乾姜


右水三盞煎至二盞再入黃連黃芩炙復煎至一

盞食後稍熱服

補肝丸 方載前圓醫內障條

還精丸 方載前健腎內障條

小 雲 翳 內 障



小雲翳者十分小也此翳多生肥壯之人或思慮過多或灯窓勤勞致傷肝腎二經動發之際不痒不痛或時昏暗或見黑花以成是疾雖則翳小其實頑健何也非翳小也乃肝實血旺金井鎖緊其翳亦隨而小宜用天字金針從上撥下緩用針此膜四圍粘黃仁若扯得緊扯傷黃仁血出雖翳收血灌瞳仁則有些痛一時不明須服退血散之藥漸至澄清終久光明切忌口及房事等宜

服密蒙花散還精丸墜血丸

密蒙花散

方載前隘翳內障條

還精丸

方載前隘翳內障條

墜血丸

歸尾

赤芍

生地

牛膝

蒺藜

石決明

五味子

川芎

知母

細辛


香附

紅花

右研細末煉蜜為丸如梧子大每服四十丸白

湯送下

障內翳花棗



棗花翳者此症頭旋腦熱痛痒不休眼前常見黃黑二花眼中有翳參差如棗花先起之時瞳仁之間金井內水中先有一點碎小粧成經二三年間凝結方成內障如棗花形狀四圍如鋸齒宜用天字金針從上撥下多的能碎屑而下蓋一清其翳不片段須撥三五下金針無妨一時雖見蒙然若烟霧視物不真隨服湯散丸藥光明復舊宜服羚羊角散涼膈散枸杞兔絲湯還精丸

羚羊角飲

羚羊角

防風

人參

知母

白朮

玄參

桔梗

各半錢

細辛

車前子

黃芩

各半錢

枸杞子

熟地

右研為末每服五錢水煎服

涼膈散

黃芩

梔子

薄荷

甘草

連翹

大黃

黃連

黃柏

朴硝

此味煎

用酒洗

右研為末每服三錢白湯調食遠服

枸杞鬼絲湯

枸杞子

鬼絲子

覆盆子

青相子

熟地黃

防風

薄荷

玄參


密蒙花

當歸

石決明

龍膽州

驚 振 內 障



右水煎磨石蠟起碗食後服

還精丸 方載前健腎內障條

驚振內障者或因被人打著或撞著或從高處跌下低處致而昏暗二三年間一如內障形狀陰看能大陽看能小不辨三光宜用天字金針從上撥下立見光明又有此症或後生人患雲翳小陰看不大陽看不小不見三光如此之狀切不可撥也宜服歸花湯當歸活血湯還精丸

歸花湯

當歸

密蒙花

黃連

熟地

構實子

覆盆子

枸杞子

玄參

連翹

石斛

防風

陳皮

白芍

右清水煎食後服

當歸活血湯

歸鬚

黃芪

沒藥

川芎

蒼朮

熟地

生地

赤芍

茯苓

紅華


香附

牛膝

右等分為細末清水煎食後溫服

還精丸 方載前值醫內障條

青 風 內 障



青風內障者無乃五風變五色不離頭
痛而起亦因酒色過度內傷腎氣不痒
不痛漸失其明眼目俱不傷損故無所
見日積月累瞳仁開大漸變青色惟
初患之時依方服藥若神氣散盡不見
三光更無治法宜服羚羊角湯歸杞湯
十一味還精丸

羚羊角湯 羚羊角 人參各一錢 麥

地骨皮 車前子 隔紙卷活錢

加當歸龍膽州各四錢

右研粗末每服二錢水煎食後服

歸杞湯

當歸

枸杞子

楮實子

覆盆子

石斛

密蒙花

熟地黃

黃連

防風

玄參

連翹

白芍

陳皮

右白水煎食後服

十一味還精丸

川芎

白朮

防風

木賊

羌活

耳艸

蒺藜

密蒙花

青柏子


鬼絲子

當歸

右研細末米糊為丸如梧子大每服四十九丸

三次茶送下

烏 風 內 障



烏風者五風變也此症不痒不痛其瞳
 仁不開大漸昏沉又無翳障是由氣
 逆使然瞳仁如黑墨形狀當此之時急
 宜服藥若經二三年間結成翳青白色
 陰看不大陽看不小至此之極不可針
 撥亦不可藥服病疾成矣雖有良醫不
 能為也宜服益肝散還陰救苦湯滋腎
 丸

益肝散

當歸

川芎

白芍

半夏

柴胡

神效明

黃芩

其州

茯苓

龍膽艸

栝實子

右清木煎食後服

還陰救苦湯

歸鬚

黃連

黃芩

黃柏各

細辛

蘇本各

升麻

蒼朮

其州

知母

川芎

防風

羌活

桔梗

龍膽艸

連翹

生地各

各研為末每服六錢清木煎食後服

滋腎丸

當歸

熟地

枸杞

白朮

白芍

白朮

牛膝

龍膽艸

覆盆子

肉苁蓉

川芎

玄參各

鬼縹子

蒼朮各

防己

厚朴

遠志

黃柏

知母

青柏子

石決明

蒺藜

香附

密蒙花

礞石

砂仁


甘州

人參

右研細末煉蜜為丸如梧子大每服三五十丸

鹽湯下或酒下

綠風內障



綠風者乃五風變化之症因肝氣熱極虛勞所致亦且腎水不滋肝氣目損日久則變為昏初時但覺頭額鼻頰諸處疼痛夜見有花紅黑不定先患一眼後乃相牽俱患此症惟初患之時宜服

羊角飲還精丸之類是也。倘至表明，僅仁變緣不見三光終無治法，不用服藥，不須針撥，然婦人多患是症，何也？心主血，肝納血，婦人以血為主，血衰不榮，羊肝致肝膽熱極，變成綠風，難矣。宜服羚羊角散，羚羊角飲還精丸。

羚羊角散 羚羊角 防風 川芎 羌活


菊花 半夏

右研為末，每服二錢，荆芥湯調下。

羚羊角飲 方載前，棗花內障條。

還精丸 方載前，臨醫內障條。

障 內 風 黑



黑風者五風變也初發時頭旋腦痛眼
 生花往來昏黑蓋因房事不節肝臟
 虛勞致使頭腦諸部骨節皆疼瞳仁開
 大因之失明當此之時切宜依方服藥
 救治若神耗散盡終為不治之症宜服
 密蒙花散鎮肝丸地黃丸


密蒙花散 方載前
 鎮肝丸 方載前

鎮肝丸 方載前
 地黃丸 熟地二兩 當歸 赤芍

地黃丸 熟地二兩 當歸 赤芍

藥本 石斛 夏枯草 椿實子

肝虛目暗障



青相子

蔓荊子

艸決明

白芍

龍膽

黃芩

遠志

黃芪

右研細末煉蜜為丸如梧子大每服三十丸食

後月進三服

肝虛目暗者此乃勞力之人多受是疾

或思家事夜卧不安或酒色過度或

夢遺精夜視細字致損肝腎二經急宜

依方服散丸若至衰明則無治法宜服

菊華補肝散人參散修肝散

菊花補肝散

耳菊

熟地

白芍

白茯苓

細辛

防風

柴胡

甘艸

柏子仁

右等分半水半酒煎令復服

人參散

方載前證醫內障條


修肝散

方載前證醫內障條

還精丸

方載前證醫內障條

雷頭風內障



雷頭風者大抵肝風熱毒上衝於腦及面目頭項俱腫初頭痛如雷痛難忍或吐或惡心故曰雷頭風久而毒氣入目當此之際如若致失明不見三光瞳仁漸大如黃蠅色日夜如一般同素無治法男子少得婦人多受是疾宜服隔肝散斷艾湯石羔散

隔肝散

知母

黃芩

桔梗

大黃

朴硝

烏豆

炒

右研為末每服四錢白水煎食後服

斬艾湯

斬艾

薄荷

菊花

細辛

兩星

全蠍

麝香

石白朮食後服

石羔散

石羔


麻黃

乾姜

何首烏

右研為末每服二錢白朮煎食後服

金星翳



金星翳者類金色皆因大病後或極頭
痛起因須與內障內同列陰看能大陽
看能小雖見三光最難撥也此症十個
之中縱有一二能光翳最堅牢又有一
症瞳仁鎖緊其翳如秤星瑩々金切不

可動針一動針黃血來混雜似水流入金井中清濁不分永為痼疾矣宜服撥雲散試効丸

撥雲散

黃連

黃芩

川芎

白芍

菊華

艸決明

麥門冬

甘艸

右清水煎食後服

試効丸

當歸身

生地黃

克蔚子

黃柏

柴胡

各五錢

熟地

赤芍

二兩

川芎

防風

知母

各三錢

羌活

牡丹皮

寒水石

丹參


香附

童便入湯煮熟去皮毛一錢

右研細末煉蜜為丸如梧子

大每服五十丸白湯下隨以食物壓之

高風雀目障內



高風雀目者乃肝中積熱腎水衰不能制伏肝火肝火壅盛致傷于目黃昏見物至點灯全不見物漸以昏朦視物惟見直上之物依方服藥外又可用夜明砂煎肉豬婆肝空心食之或羊肝連膽煮露一宿切薄空心蘸夜明砂食之亦可此症初患時若不請調理延至日久變為青盲終為不治之症宜服清肝散光明夜靈散夜明散羊肝丸

清肝散

方載前沉翳內障條

光明夜靈散

石決明

煨夜明砂

研各五錢

豬肝

生用

右藥二味和勻以竹刀切豬肝作二片將藥鋪

肝上合定以麻線縛束勿令藥出外用米泔水

一大碗入磁罐內煮肝泔水煮乾至一小半臨

臥連肝并汁同食之立効

夜明散

夜明砂

谷精艸

木賊

蠟蛻

蚌粉

各一兩

右研細末以豬肝切開捲捲藥末在內放鍋內

煮熟細嚼下効

羊肝丸

當歸

洗


赤芍

白芍

蒼朮

各一兩

肝虛雞盲障



肝虛雞盲者乃肝之虛也雞盲與雀目不同至酉時黃昏則不見物至點燈時又見物雀目者黃昏見物點燈時全不見物故此分為兩症雞盲者惟視下之物雀目者惟視上之物能視上者

香附 <small>四</small>	玄參	牛膝	鬼絲子 <small>四</small>	熟地 <small>四</small>
白朮	柴胡	黃芩 <small>各一兩</small>	州決明	蔓荊子
茯神	知母	黃柏 <small>各七錢</small>	龍膽州	青柏子
枸杞子	石決明 <small>炒</small>	麥門冬 <small>去心各一兩</small>	同羊肝為末煉	
蜜為丸梧子大每服三十丸溫湯下				

宜補肝散能視下者宜車肝散雞盲之症亦宜白豬
婆肝空心蕪夜明砂食之或用老米煮鴨肝粥頻
食之宜服補肝散車肝散

補肝散

大黃

煨

川芎

菊花

防風

大力子

炒

荆芥

玄參

蒺藜

細辛

黃芩

梔子

木賊

耳聾

艸決明

蒼朮

蔓荆子

右為細末每服二錢臨臥飲湯調或酒調下

車肝散

細辛

黃芩

防風

充蔚子

木賊

大黃

車前子


本賊

九黃

車前子

右為末，烏豆七粒同煎，食後服。

白翳黃心內障



內翳黃心者，由勞傷太過，肝膽風熱，虛火上攻，有時昏朦，不能辨物，翳形如梅片，白似銀，惟黃一點黑中，初起之時，瞳仁中間先有一點，如粟米大，月夕圓，漸湊成內障，此翳須二三年間方可撥得下。若年近恐撥散不成片而下，此症易識，中間分明一點，厚些，四圍不共一色而薄也。宜服密蒙花散，墜翳丸。

密蒙花散

方載前，滋醫內障條

墜翳丸

青相子

艸決明

煨

玄參

細辛

防風

赤芍

煨

車前子

谷精

艸

熟地黃

密蒙花

龍膽

黃芩

煨

白蒺藜

炒

木賊

蟬退


各五錢

石決明

煨

右研細末，煉蜜為丸，如梧子大，每服三十丸，食後滾湯下，或酒下。

黑 華 翳 內 障



黑花翳者此症頭旋腦熱眼黑生花肝
 膽積熱風上衝腦凝成翳如烟色如銅
 煤百州霜之狀隱隱淺沉在水之中不
 能視物先患一眼後乃相牽俱暗此症
 多是思慮性躁之人有之雖以此症須
 經三五年間不辨三光陰看能大陽看
 能小依法須用天字金針從上撥下其
 翳連入扯得長黑翳方離瞳仁瞳仁偏
 回圓停針良久方可出針眼光明在
 宜服治眼散涼膽丸

治眼散

當歸

白朮

白芍

羌活

菊花

赤芍

密蒙花

梔子

右水煎起碗加冬密少許和服

涼膽丸

黃連

黃柏

黃芩

防風

荊芥

蘆薈

龍膽草

柴胡


地茄子

右研細末煉蜜為丸如梧子大每服三十丸清

茶送下

秘傳眼科全書卷之四

大背赤脉穿睛外障



赤脉穿睛之症起于大背者心之實熱也此心邪之侵肝也心屬火主血肝屬木主筋得血灌引漸至黑睛慢掩瞳仁甚則看物如隔紙絹大抵二焦相火炎上或勞神心事太過或夜觀書史或能飲酒或好食五辛諸熱物皆致生是疾治法宜隔火退熱有老少不同之治法積月累筋脉大者用小鋒針逐箇抽斷毒血流出赤脉斷矣若是不發赤脉

不用抽法只煎以清涼丹藥服以四順散八正散當歸散導赤散

四順散

當歸

大黃

耳艸

赤芍各等分

右研為末白水煎食後服

八正散

篇蓄

瞿麥

梔子

大黃

木通

滑石

車前子

耳艸

右等分加竹葉灯心葱頭同煎食後服

當歸散

人參

桔梗

白茯苓

玄參

黃芩

羚羊角

大黃

白水煎食後服

導赤散

生熟黃

梔子

木通


耳聾

灯心

淡竹根

右白水煎食後服

小 背 赤 脉 附 睛 外 障



小背赤脉附睛者心之虛也與大背不
同故分兩症治之大背赤者心之實也
小背赤者心之虛也心者五臟六腑之
宗且屬南方候象火德又屬五行生旺
火生土火乃土之母脾土實則心火虛
矣治法先瀉其脾之實後補其心之虛
多因夜勤灯火勞傷心經致心氣虛弱

血運不行積在下背不散宜補心之劑服之因大背與小背之症殊故引此二者以為後學者識焉此症宜點藥不宜抽剪宜服加減大黃當歸散歸脾散九仙飲補虛人參扶冬丸

加減大黃當歸散

大黃

當歸

耳州

人參

白朮

黃芪

麥門冬

知母

桔梗

黃芩

連翹

白水煎食後服

偏脾散

方載後鷄冠蠅肉外障條

九仙飲

當歸

川芎

赤芍

黃芩

其州

荆芥

菊華

白芷

木通

白水煎食復服

補虛人參茯苓丸

人參

白茯苓

遠志


白姜蚕 其州

白附

續斷

右研細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼
桔梗湯下

勞 肉 攀 睛 外 障



勞肉攀睛者與大眦赤脉同然此症脾
胃熱毒心肺二經火邪衝自致有內眦
肉息漸起攀睛久而不退蓋脾為倉稟
之官肌肉之府脾受肝邪多是七情鬱
結之人或夜尋思家事無歇或飲酒樂
慾致使三焦壅熱或肥壯之人血滯于
大眦勞肉發端之時多痒因用手擦摩
勞肉漸生侵黑睛日積月累者為實
下發下起者為虛治法實者以小針為
鉤鉤起勞肉剪斷些寬三五日剪根底

攸備方可用藥吹點餘翳漸消須避風忌口漸戒
若下發者不宜鉤剪只宜服藥點以淡丹藥宜服
子勝奇湯龍膽州散冷風湯三寶丸

梔子勝奇湯

梔子

石膏

草決明

防風

荆芥穗

木賊

蒺藜

蟬蛻

羌活

黃芩

蔓京子

谷精艸

密蒙花

菊華

甘艸

右研為細末每服二錢臨臥時熱茶調下

龍膽州散

龍膽州

甘艸

木賊

州決明

菊花

各二兩

川芎

香附

各二兩

右研細末每服二錢麥門冬薄荷煎湯和砂糖
一匙同調臨卧服

冷風湯

防風

黃芪

克薜子

桔梗

五味子

細辛

大黃

白水煎食後服

三黃丸

黃連


黃芩

大黃

分丸

右研細末煉蜜為丸如梧子大每服三十丸滾
湯下

雞冠蜆肉外障



雞冠蜆肉者心之熱酒之毒也脾胃壅
 滯肝臟積熱肉翳漸久而長黑睛發來
 高大形似雞冠蜆肉壅蔽大眚皆因相
 胃火鬱結致生紅肉稜齒淚出治法初
 發之時用小鋒針破使惡血流出以
 輪其肉二三日又針一次又法可剪竹
 葉作捲小筒彈進鼻孔內放出血或用
 小針亦可右孔左眼左孔或用三黃丸
 或朴硝丸如彈子大夜含化一丸以沃
 上焦之火正為揚湯止沸莫若去薪發

久肉翳者可烙三五度其效甚速烙可用軟皮剪孔
滋按眼眶烙則不傷四眥此肉有虛有實若虛切不
可剪則血流汪々變為甚害或壅為桃李狀難治
矢劑宜服為脾散抽風湯

偏脾散

歸鬚

赤芍

石膏

黃柏

黃連

艸決明

蒼朮

枳殼

柴胡

香附

大黃

朴硝

右水煎一二沸再加硫黃同煎半飢服

抽風湯

防風

桔梗

大黃

細辛

黃芩

玄參

車前子

各兩
五錢朴硝兩

右為末，每服四錢水煎服

三黃丸


黃連

黃芩

大黃等分

加黃柏知母俱用湯水炒

兩臉粘睛外障



兩臉粘睛者脾胃風虛冷弱邪氣聚于臉以致胞臉風赤濕爛肝膈虛熱眵粘四眥夜睡上下胞臉膠凝粘緊血滯不散久則漸生翳膜治法宜用陰一陽三丹藥吹點若發年久眼皮漸長雖不見拳毛倒睫亦可夾些眼皮使露黑睛消散血氣斂積有瘀血可剝可洗爛痒者

洗以碧天丹每日清晨用桑白皮煎湯入鹽蒸洗或
大寒後不落之桑葉名為鐵扇子煎洗乃妙或菊華
菊葉煎湯洗亦可此乃發歇年久有此症初發無此
症矣宜省風湯洗風桑白散烏犀角丸

省風湯 方載沉疴內障條下

消風桑白散

桑白皮

防風

荆芥

前胡 升麻

姜蚕

蔓荊子

川芎

蟬退 羌活

薄荷

右向水煎食後服

犀角丸

犀角

桑螵蛸

白菊花

赤芍

玄參

人參


山藥

羌活

各二兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服二十丸酒湯送下

胞肉膠凝外障



胞肉膠凝者與兩眼凝睛同治法亦頗同之然前症臉之病此症胞之病臉熱則眵粘病之淺臉熱則膠凝病之深須分作兩症治之脾胃壅熱肝膈風亢胞內蠹肉壅起爛濕眵粘膠凝氣血壅滯不能疏散積之年久黑睛生翳珠昧不明羞明怕日治法用陰二陽四清涼

丹吹點有瘀血可刺洗以桑白皮鐵扇子白菊華當
歸防風荆芥木賊薄荷塩花之類胞肉積久堅硬厚
實翻轉二三度而實肉自可消宜服細辛湯除風湯
三黃丸

細辛湯 細辛 防風 人參 白茯苓

五味子 車前子 玄參各一兩 地骨皮 黃芩

澤瀉各一兩 甘艸錢五

右用白水煮煎食後服

除風湯 防風 細辛 桔梗 充蔚子

黃芩 大黃 五味子 薄荷 石膏

黃柏

州決明

右水煎食後服

三黃丸

方載前努肉攀睛條下

胞肉生瘡外障



胞肉生瘡者與胞肉膠凝臉生風粟兩
臉粘睛之症大同小異此皆上胞下臉
症也然中間分折治法各有輕重淺深
刺洗針烙不同胞肉生瘡者大抵脾胃
毒熱胞肉疔瘡或風粟受而為瘡者血
熱化膿腐爛涎淚汁流膿浸漬黑睛生
翳眼如硃砂顏色此症雖少不可不知

治法用陰二陽十丹藥吹點日用桑白皮煎湯入枯
礬塩花翻轉眼皮以鴨翎刷洗有瘡處以血竭乳香
沒香輕粉陀僧為末厭之或有瘡處烙二三下無妨
宜服隔脾湯清和散墜肝丸
瀉脾湯 方載雞冠蛄肉條下

清和湯

連翹

防風

荆芥

薄荷

苦參

玄參

升麻

秦艽

瓜蒌根

右加灯心同煎食後服

墜肝丸

五味子

石決明

車前子

知母

澤瀉

山藥

各二兩

防風

二兩

龍膽州

青相子

柴胡

黃芩


州決明

白芍

蔓荊子

右為末，煉蜜為丸，如梧子大，每服三、四十丸，清茶送下。

障外粟風生臉



臉生風粟者，臉間積血年久，致生風粟，與眵粘症同。然臉眵粘睛，無風粟也。故此分臉生風粟，又作一症。蓋胞者上胞，臉者下臉也。脾胃壅熱，致令胞臉之間，漸成風粟，如麻如米，甚如楊梅之狀。摩擦腫仁，黑睛有翳，久漸昏流淚不止。治法：翻轉眼皮，以風粟逐筒，用鋒針密

密針三五度亦烙之更妙黑睛有翳者用陰三陽五
丹藥吹點二三夜吹一次忌口動風動血之物不宜
食宜服除風湯退熱飲敗毒散

除風湯

羚羊角

山犀角

防風

知母

黃芩

玄參

荆芥

桔梗

大黃

朴硝

黃連

右為末用水煎服

退熱飲

五味子

黃連

黃芩

車前子

梔子

石膏

連翹

赤芍

龍膽艸

玄參

防風

黃柏

地骨皮

充蔚子

右水煎食後服

敗毒散

大黃

荆芥


牛蒡子

蔓荊子

尊師

右用水煎服

天行赤眼



天行赤眼者謂天氣流行毒氣能傳染於人一人害眼傳於一家不拘大小皆傳一遍是謂天行赤眼腫痛沙障難開或三五日而愈者此一候之氣其病實矣治法此症不宜剽洗只用五七歲童子小便煎黃連露一宿溫洗日進五遍

以解惡毒之氣，更用胡宣二連明礬雄黃研細調姜汁點二背，通其惡淚，其痛立止。或酒調散酒煎散服，二三貼無妨。此症只氣候瘴毒之味，雖痛之重終無傷于黑睛瞳仁也。宜服漏肝散八正散洗宜洗眼散。

漏肝散

黃連

黃芩

梔子

赤芍

耳菊

木賊

龍膽艸

防風

葶藶子

升麻

甘艸

陳皮

大黃

朴硝

右水煎食後服

八正散

方載前，大背赤脉穿睛條下。

洗眼散

冬青葉

側柏葉

甘艸

細辛

黃芩


防風

荆芥

薄荷

右一貼一兩煎濃黃洗目洗三次

木患後生翳外障



大患後生翳者與天行赤眼實同一症也何分兩症治之蓋天行赤眼只一候或五七日愈矣症雖同無生翳之患若大患後生翳初時陡然而起腫痛發來甚重以滋難忍增寒發熱坐卧不安或通夜行至達旦羞明怕日淚出如湯鼻涕唐流兩眼腫起如桃日夜呻吟飲食無味二七不愈遂生白翳如黃膿疥

瘡占在風輪其腦牽痛治法須用胡宣二連藥煎前
研細調姜汁點用苦桃葉側柏葉艾葉柳葉熏洗服
四順八正導赤散雖治療痊亦只奇味二三箇月方
得復舊失調理者喪明必矣

細辛湯

細辛

充蔚子

玄參

黃芩

桔梗

大黃

車前子

石水煎食後服

四順散

方載前大皆赤脉穿睛餘下

八正散

方并同

暴露赤眼生翳外障



暴露赤眼生翳者此症與天行赤眼同
但天行赤眼能傳染於人暴露赤眼這
患於一人而無傳染天行者雖腫痛而
無翳暴露者腫痛而生翳泪出故此有
別治法扣其所因量其老幼虛實熱則
清涼之結則調順之此眼縱有淤血切
不可剝洗亦不可進補藥宜服酒煎散
發散內加麻黃蒼朮或大黃當歸散疎
通血氣點以淡藥洗以黃連當歸防風
荆芥菊花側柏葉赤芍薄荷之類又宜

服瀉肺湯鎮肝丸

當歸散 方載前大背赤脉穿睛條下

酒煎散

防風

防己

荆芥

其州

當歸

赤芍

牛蒡子

右為末每服三四錢水一盞酒一盞同煎食後溫服

瀉肺散

桑白皮

梔子

前胡

桔梗

枳殼

玄參

防風

赤芍

黃芩


蔓荊子

石膏

大黃

水煎食後服

暴風客熱外障



鎖肝丸

細辛

猪實子

夏枯草

石斛

人參

石決明

山藥

羌活

藜蘆

五味子

白茯苓

右為末，煉蜜為丸，如梧子大，每服四十九，清茶下。

暴風客熱此症與暴露赤眼同暴露者肝心二經病也故赤而痛致黑睛生翳暴風客熱者肝肺二經病也故向仁生虛翳四圍擁繞朝伏為睛凹入向仁紅翳壅起痛澁難開故分別暴露與暴風之症暴者乍也驟也陡然而起治法疏

通退熱涼膈，傷肝增減酒調之劑，發散風熱。俗云：眼熱忌酒，孰知酒能行血，藥無酒不能行於頭目。此眼不可剝洗，不可點涼藥，暴客之障來之速，去之亦速也。非比五臟六腑蘊積發歇之症，同俗謂傷寒眼也。宜服瀉肝散、涼膈散、三黃湯。

瀉肝散

方載前，天行赤眼外障條下。

涼膈散

方載前，棗花內障條下。

三黃湯

黃連五錢

黃芩二兩

黃蘗二兩

大黃二兩

黃芩二兩

黃芩二兩

加，旋子、荆芥、防風各五錢。

右為細末，用蜜調，不拘時候服。

疼如神祟外障



疼如神祟者此因心火積鬱血熱為病
 好惡不常久延患謂之邪祟舊無根
 基或目痛而夜愈或夜痛而日愈如艾
 之灸如針之刺忽來忽去無蹤無跡故
 號曰神祟世豈有神祟為禍而能害眼
 蓋由陰陽偏勝動靜氣血攻擊使然亦
 有信巫之人因祈禳作福而愈者有之
 孰知病勢將除偶因如此而愈曰神祟
 眼非也治法痛時只宜蔥葉熨之服酒
 煎散一二三貼止痛點以時藥洗以歸尾

白芷防風赤芍川芎生地黃止痛散血可也
煎散羚羊角飲七寶洗心散

酒煎散 方載暴露赤眼外障條下


羚羊角飲 方載棗花內障條下

七寶洗心散 歸鬚 赤芍 大黃酒洗 荆芥

梔子 甘州 麻黃

右白水煎食後服

痛如針刺外障



痛如針刺者卽是神農症中如父之灸
 如針之刺二病同然此症皆因心臟潛
 伏毒熱風壅在於眼間目弦頭痛眼系
 常急夜臥痛淚出難開時若針刺
 相似久則翳膜鼓睛急宜服隔心湯八
 正散之劑口噙水噙以雄黃止其頭痛
 點以時藥散血氣洗以側柏葉防風
 荆芥薄荷黃連生地黃之類黑睛有星
 如釘之釘凹進痛如針刺者點以淡藥
 可也宜服隔心散八正散洗心散

瀉心散

大黃

黃芩

桔梗

知母

玄參

防風

馬兜鈴

右水煎食後服

八正散

方載大背赤脉穿睛外障條下

洗心散

當歸

防風

薄荷

荆芥

麻黃

甘州

赤芍


白朮

大黃

白朮

右等分爲末每服三錢食後白湯調下

障外後病熱寒傷



傷寒熱病後外障蓋由大病新痊熱毒未除餘熱未盡形體羸瘦臟腑未實氣血尚虛陰陽偏勝未復縱口多食五辛油膩煎炒一切之物諸毒蓄積于內熱邪表出于外攻衝于眼人有五臟六腑之精華其症各現于五輪此症發時赤腫淚出痛澁難開瞳仁偏大黑花繚繞不能遠視此血虛也治法點以時藥散風活血當歸地黃菊花荆芥防風薄荷之類不宜剝洗只宜平補臟腑損其有

肝...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

餘益其不足是為治法也此症切須忌口毒物皆不

可食忌兩三箇月方可宜服瀉肝散決明散熊膽丸

瀉肝散 方載前天行赤眼外障條下

決明散 石決明 羌活 荆芥 梔子

木通 赤芍 麥門冬 地黃根

右白朮煎飯後服


熊膽丸 熊膽 車前子 澤瀉 細辛

石決明 牛膽 充蔚子 乾地黃 龍膽州

右為末煉蜜為丸如梧子大每服三四十丸白

湯下或酒下

風牽出臉障



風牽出臉者脾胃受風壅毒在胞膜之間
 間臉受風而皮緊脾受風則肉壅此皮
 緊肉壅風牽出臉候出任無分四季
 此土障不能隄水也積於臉濕爛之狀
 治法先用摩風膏刮散皮外風邪搽以
 白薇膏消散風毒翻轉臉皮烙三五度
 無妨此症一年半載易治若年久肉堅
 難治若眼有紅筋貫上黑睛有翳有膜
 吹以丹藥痒爛洗以碧天丹此症大抵
 眼眩之病也此症大風癩疾之人面部

所牽多受是疾難以調治故名爲風牽出脫宜服黃芪湯及搽白麝膏

黃芪湯

黃芪

充蔚子

人參

白茯苓

地骨皮

大黃

其州

右白水煎食後服忌口

白麝膏

白麝

白芨


白芷

白麝皮

加石決明牛蒡子

右等分爲末用牛脂熬將末入內同熬成膏早晚以膏搽于臉胞屢用有効

風牽喎斜外科障



風牽喎斜者，雖與風牽出臉同，然喎斜者脾胃虛，房事不節，脾胃有毒，皮不安，亦或醉飽坐卧，當風貪涼，左右忽受風牽，喎斜眼中亦痒，時時顫動，其眼血絲四起，瞳仁不開，大視物，淚甚至半身不遂，治法急用摩風膏，摩擦面部，更以割便其將所患風牽一邊，手臂通割，或遍身亦可割，一月一遍，用大磁青碗，搗碎入磁石，多寡搜麵糊，為餅烘熟，貼面對鼻，一邊左喎貼右，右喎貼左，貼至扯

口眼端正其藥取起又可灸頰車耳門穴開口裏之
太陽人中承漿啞左灸右啞右灸左近患易治若患
經年難治宜服羚羊角飲及攻風敗毒散又擦摩風
膏

羚羊角飲 方載前藥花內障條下

攻風敗毒散 藥本 羌花 羌活 防風

川烏 艸烏 山烏豆 骨碎補

右肉水煎食後服


摩風膏 當歸 川芎 白芷 防風

細辛 香附 木香 赤芍 肉桂

骨碎補 沒藥

右用猪脂或牛脂或鵝脂入黃臘熬膏用

障外破撞物被



被物撞破者並無所患病有所因者三
此外因也全然無事誤被撞破或打著
或墮著或跌著傷損胞膜積血紫青撞
破白仁傷其硬殼此不能為害惟撞破
黃仁風輪血灌瞳仁與水輪混雜為害
控痛惡腫忍淚難開治法服以酒調散
熨以葱艾或搗爛生地黃作餅烘熟貼
之一日一換以散其血如無生地黃可

用芙蓉根割去帶泥粗皮用白皮搗爛烘熟貼之亦可若眼眶青黑搗羅蔔宜將息避風忌口動風動血之物及諸般血肉莫喫新撞易治若久撞血滯不散無疼痛則難治也宜服除風湯當歸活血散歷熱飲子

除風湯 方載前臉生風粟外障條下


當歸活血湯 當歸 赤芍 川芎 牛膝

紫蘇 生地黃 烏豆 蒲黃 桂心

乳香 沒藥

右白朮煎酒起碗食後服

障外翳生刺撞



壓熱飲子

犀角

大黃

知母

向莢

麥門冬

甘州

人參

生地

歸鬚

赤芍

蕤蕤

紅花

牛膝

香附

右白水煎飯後服

被物撞刺生翳者與撞破一理然刺則被竹木簽刺痕傷損血滯慨遂生血翳
 礮磁淚出紅筋滿目此翳外傷與患生
 翳不同患眼者五臟六腑之毒發出有
 根病也刺傷者外傷也與內無預治法
 與前症同但一七之後痕變成翳可用

輕丹少吹點忌保慾噴怒須避風將息甚失調治漬
痛發腫傷於風輪血流入井中清濁相間釀成大患
致於傷睛或至瞎進無治法也宜服退翳散充蔚子
散退熱散

退翳散

人參

玄參

白朮

黃芪

五味子

羌活

細辛

車前子

右白水煎食後服

充蔚子散

充蔚子

防風

川芎

玄參

桔梗

桑白

知母

藜蘆

白芷

細辛


如熱甚加硝黃

退熱飲

方載前臉生風粟外障條下

右向水煎食後服

血灌瞳仁



血灌瞳仁者因毒血灌入金井瞳仁水內也猶如供水流入井中之狀清濁相混時痛眩紅光滿目視物朦朧如隔紗縑看物若烟霧中然先患一眼後乃相牽俱患此症有三肝病血熱月積月累灌入瞳仁血凝入水關乎肝腎二經病也此血難退撞破之血鮮而熱灌之雖甚退之亦速又有開金針失手撥著

黃仁亦有血腫腫仁舉此三症治法頗同宜服大黃
當歸散沒藥散墜血明目丸前被物撞破及撞刺生
贅并血腫腫仁皆可服此三藥其効甚大或生地黃
芙蓉根搗爛烘熱貼三症通可用或蔥又熨法俱可
用醫理可方可圓不可拘宜服大黃當歸散麥門冬
湯沒藥散墜血明目丸

大黃當歸散

當歸

川芎各一兩

大黃

黃芩

赤芍

杏仁各五錢

右為末每服三錢加薄荷七葉同煎空心溫服

麥門冬湯

麥門冬去心細辛

桔梗洗

桔梗

玄參各分

大黃

朴硝各分

右木煎朴硝化清食後溫服

沒藥散

沒藥

血竭

大黃

朴硝

右為末茶調或酒亦可

墜血明目丸

石決明

川芎

五味子

知母

山藥

細辛

人參

歸鬚

赤芍


生地

牛膝

茯苓

右為末煉蜜為丸如梧子大每服四十九酒下

黑翳如珠外障



黑翳如珠者肝腎俱勞七情鬱結之人
 毒氣攻冲熱極淚出難開疼痛甚至水
 輪突起黑翳如豆如珠大小不定撐起
 眼胞疼痛礙人眼睛難以運動寢食不
 安先患一眼後乃相牽俱損治法用小
 鋒針透个橫穿破其黑翳中有惡水流
 出即平勢若拍芥瞬息安痊眼即能開
 設若不識此療服涼劑點涼藥安能取
 效小兒如此患者多是疳眼其翳起來
 突或如小香蕈之狀不宜針其治法戴

在後小兒疳傷眼分障條下若前論針破翳根處宜
用淡丹藥吹點消磨翳根宜服羚羊角飲酒調洗肝
散補腎丸

羚羊角飲

方載前集花內障條下

酒調洗肝散

桔梗

玄參

知母

施子

大黃


朴硝

右為末每服二錢溫老酒調下

補腎丸

方載履月醫內障條下

障外痛疼睛翳



翳睛疼痛者與黑睛同症起於瞳仁然
 黑睛者肝腎之病五臟熱毒所致致令
 烏睛上黑睛突起如豆如珠翳睛者其
 翳起占瞳仁翳根小而苗大此乃膽腑
 之病腦中壅塞毒騰氣伏熱赤腫淚出疼
 痛難開怕日羞明其翳將發尖高如翳
 眼形狀恰法同前症用小鋒針針出惡
 水流盡即平吹點以淡丹藥潤其翳根
 但所服不同前症宜陽肝補腎之劑服
 之宜服陽肝散退熱飲酒調洗肝散滋

腎丸

鴈肝散

方載前天行赤眼外障條下


酒調洗肝散

方載前黑翳如珠外障條下

退熱飲

方載前臉生風粟外障條下

旋螺突起外障



旋螺突起者熱積於肝膽毒壅於膈間
冲攻睛珠疼痛中央瞳仁漸變青白
色忽然突起血絲纏繞此乃風輪水輪
二家併熱旋起突狀如螺尾遂號旋螺
突症治法宜用陰二陽四丹熱吹點或
調蠔魚血點突處又方用白鳳屎如獐

稀的夜臥時以鴈翎搽抹於突處夜々如是以毒
攻毒之物點去而効驗也若年久須用針對瞳仁中
尖針入半分放出惡水此乃取平之効須用藥封保
養避風忌口十數日可也宜服偏肝散退熱飲搜風
湯補腎丸

偏肝散

方載前天行赤眼外障條下

退熱飲

方載前臉生風粟外障條下

搜風湯

防風

白芷

細辛

羌活

赤芍

羌活子

薄荷

五味子

菊花


荆芥

玄參

大黃

朴硝

突起睛高外障



右白水煎食後服

補腎丸 方載前圓腎內障條下

突起睛高者險峻利害之症也此前旋
螺突大不睇矣皆因五臟毒風所蘊熱
極而上衝眼者內屬五臟外現五輪五
臟之氣毒攻五輪瞳仁突起麻木疼痛
汪々淚出病勢洶湧卒暴之變其側非
精於龍樹之奧旨不能措手全如謬云
眼不醫不瞎正此謂也苟非其人殆有
其為非徒無益而反害之治法揚湯止

佛莫若去薪急投酒調散酒煎散退五臟之毒熱搗葱艾熨五輪之突起消除疼痛洗以白芷細辛當歸蒼朮麻黃防風羌活未可便點藥宜忌口輩腥將息避風治若稍遲或膿或腔或突出一寸高者至共之際須鋒針針出惡水痛方止睛高雖平亦無光之効也宜酒調散酒煎散蟬花散服之

酒調散

槐花

蛤粉

防風

山梔

牛蒡子

各二兩

右為末每服二錢食後酒調下

酒煎散

方載前暴露赤眼外障條下

蟬花散

羌活

獨活

桑白皮

黃芩

谷精州

川芎

細辛

石膏

荆芥

蒺藜

蔓荊子

車前子

牛蒡子

桂枝

右白_二水煎食後服_三

秘傳眼科全書卷之四終